

## 용법 · 용량

성인: 1회 1캡슐, 1일 2~3회 식전에 복용한다.

## 사용상의 주의사항

### 1. 다음환자에게는 투여하지 말 것

- 1) 이 약의 성분예 과민증이 있는 환자
- 2) 저혈압 환자
- 3) 무력성 장폐색증 환자

### 2. 이상반응

이 약을 투여하는 동안 바람직하지 않거나 불필요한 효과가 나타날 수 있다.

- 1) 과민반응 : 드물게 두드러기, 가려움증, 발진 및 아나필락시스를 포함하는 알러지 반응이 나타날 수 있으며 후두부종, 속을 동반할 수 있다.
- 2) 소화기계 : 때때로 연변, 복부불쾌감, 설사, 복통, 구토, 구역, 복부중압감, 식욕부진이 나타날 수 있다.
- 3) 기타 : 드물게 간기능 이상이 나타날 수 있고 투여 중단 후 정상화 될 수 있으며, 드물게 두통, 어지럼증이 나타날 수 있다.
- 4) 국내에서 6년동안 786명을 대상으로 실시한 시판후 조사결과 변비 1례가 보고되었다.

### 3. 일반적 주의

- 1) 도핑테스트를 실시할 때 양성반응을 일으킬 수 있다.

2) 정해진 용법 · 용량을 지켜야 한다.

3) 이 약의 복용으로 이상증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사에게 알린다.

4) 다른 약물과의 잠재적인 상호작용을 피하기 위하여 복용중인 약물을 의사 또는 약사에게 알린다.

#### 4. 임부 및 수유부에 대한 투여

##### 1) 임부

동물시험에서 중대한 태아독성 또는 최기형성을 나타내지는 않았으나, 사람에 대해서는 확인되지 않았으며, 임신기간 중의 약물의 사용은 신중하여야 하기 때문에 임부에게는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

##### 2) 수유부

검토된 바가 없으므로 수유부에게는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

#### 5. 소아에 대한 투여

만 18세 미만의 소아에 대한 안전성 · 유효성은 확립되어 있지 않다.

#### 6. 과량투여시의 처치

과량 투여시 저혈압 및 아트로핀 유사 독성이 나타날 수 있다. 과량투여시 처치는 저혈압에 대한 보조요법과 함께 아트로핀 해독과 동일한 요법을 행한다.

#### 7. 보관 및 취급상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것