

사용상의주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

1) 본인 또는 양친, 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 알레르기성비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키

기쉬운 체질을 가지고 있는 환자

2) 약으로 알레르기 증상(발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자

3) 간장애, 신장애, 갑상선질환, 당뇨병 등 병이 있는 환자, 고열환자, 허약자

4) 심장애 및 고혈압 환자, 고령자

5) 다른 약물을 투여받고 있는 환자

6) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 부작용

이 약을 투여하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 식욕부진, 어지러움 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고

약사 또는 의사와 상의한다.

4. 일반적 주의

1) 정해진 용법용량을 잘 지킨다.

2) 수회 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다

5. 상호작용

다음 약물과 병용하지 않는다

다른 진해거담제, 감기약, 항히스타민제, 진정제, 알코올 등

6. 소아에 대한 투여

7세 이하의 영유아에는 시럽제를 투여한다

7. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다
- 2) 직사일광을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다